

Diagnóstico Diferencial

CHANCRO SIFILITICO o duro.

Espiroqueta. Schaudin-Hoffman.

Erosión mínima única, genital o extragenital, preferentemente en mucosas.

Forma redonda, orbicular.

Sin bordes, ni resalto y sin ribete rojo inflamatorio.

De base indurada, "signo del postigo".

Color rojo, a veces gris, difteroides.

No secretante ni supurante.

No reinoculable.

Con bubón satélite. Reacción ganglionar afegmática.

Diagnóstico ultramicroscópico.

Reacción de Bordet-Wassermann.

Reacción de Kahn.

Reacción de Chediak.

Reacción de Kline.

CHANCRO BLANDO

Estreptobacilo Ducrey-Unna.

Micropústula. Ulceración única o múltiple genital o extragenital, preferentemente en piel con tendencia a sangrar.

Forma redonda u oval, irregular o en raqueta.

Con bordes desprendidos y ribete rojo inflamatorio.

De base blanda, edematosa.

Color rojo amarillento, sucio, sanguinoso.

Supurante.

Reinoculable. Autoinoculable.

Con bubón satélite que puede enchanerarse.

Diagnóstico microscópico.

Intradermorreacción de Ito-Reens-tierna.

Intraepidermoinoculación de Ravaut.