

9° **AEDES PERICHARIS, DYAR**

V Hembra adulta:

Trompa más bien larga y delgada, uniforme, negra. Occipucio con escamas blanca amarillentas, una mancha negra sobre el lado. Mesonótum con escamas castaño oscuras, una banda plateada a lo largo de cada lado, la cual forma un diente anterior, la parte anterior de la banda con el diente formando una marcada curva lateral, pleura y coxa con escamas blanco amarillentas. Abdomen negro, con pequeñas bandas blancas basales segmentales, más pálidas centralmente y algunas veces dejando solamente manchas laterales; vientre con valvas basales de los segmentos con escamas blancas, las valvas apicales negras. Patas negras, el tarso con pequeños anillos blancos en las bases de las articulaciones, más o menos abarcando también los ápices; fémur y tibia con los extremos blancos. Alas con escamas negras y angostas.

2° **Larva:** Desconocida.

Distribución geográfica: Costa Rica y Nicaragua.

10 AEDES THORNTONI, DYAR Y KNAB

1' Hembra adulta:

Trompa moderada, uniforme, negra. Occipucio con escamas erectas, pálidas, sobre el vértice, blancas detrás de los ojos y negras abajo. Mesonótum con escamas castaño oscuras, la mitad anterior plateadas al través, el margen pequeñamente indentadas y algunas escamas plateadas como en el espacio antescutelar; pleura y coxa con escamas blancas plateadas. Abdomen negro, los segmentos con manchas blancas angulares en las bases; vientre con los segmentos blanco plateados en la base, negros en el extremo. Patas negras; pata delantera con una pequeña mancha blanca en la base de la primera y segunda articulación torzal; fémur medio y trasero can blanco en la punta; patas media y trasera con la primera articulación torzal blanca en la base y extremo ancho, la segunda articulación blanca en la base, con dos anchos anillos blancos; alas con escamas angostas y negras.

Descripción de la larva:

Cabeza redondeada, combada a los lados; antena más bien larga, delgada con un pelo en el medio. Pelos de la cabeza sencillos, penacho preantenal de tres. Peine lateral del octavo segmento con un lunar de 4 hileras profundas de muchas escamas. Tubos aéreos más de tres veces largos que anchos, aguzados sobre la mitad externa; peine no alcanzando el medio, seguido a distancia por un mechón de 4 pelos. Segmento anal más largo que ancho, la placa alcanzan-

do abajo del medio del lado; brocha, ventral con pequeños mechones precedentes no antes de la mitad del segmento. Penacho dorsal con un pelo largo y brocha sobre cada lado; penacho lateral de 5, distintos. Agallas anales tan largas como el segmento, puntiagudas.

Distribución geográfica: Nicaragua, Panamá, Costa Rica.

11 AEDES MEDIOVITATUS, COQUIXET

Descripción de la hembra adulta:

Trompa delgada, negra. Palpos con la punta blanca y un anillo blanco. Occipucio con una línea recta de escamas plateadas en el medio, negro sobre cualquier lado, moteado de blanco abajo. Lobos protorácicos con una línea de escamas plateadas. Mesonótum con el integumento amarillo, cubierto con escamas castaño oscuras; una línea media, angosta, plateada al espacio antescutelar, y una doble línea rodeando el espacio; una angosta línea subdorsal de color de oro sobre su longitud; una línea quebrada lateral plateada; pleura y coxa con lunares de escamas plateadas. Abdomen negro con bandas lunares blanco amarillentos en los segmentos basales y manchas laterales plateadas; vientre amarillo paja con manchas negras esparcidas. Patas negras, fémur con una línea blanca en toda su longitud y extremo blancos; tibia con una manchita blanca en el medio, más grande en las patas traseras; tarso con manchas blancas en la base de las primeras dos articulaciones sobre el frente y la pata media, sobre las patas traseras todas las articulaciones están marcadas de blanco en la base, el cuarto y quinto, excepto en las puntas. Alas con escamas angostas color castaño oscuro.

Larva: Cabeza **redondeada**, no hay combamiento de los lados; antena más bien larga, delgada, lisa, con un mechón cerca del medio. Pelos de la cabeza sencillos, el par inferior hacia abajo sobre la cara (como en Howardina), el mechón intermedio múltiple, pero corto, mechón preantenal en dos. Peine lateral del octavo segmento con seis grandes escamas. Tubos aéreos dos y medial veces tan largos como anchos, el peine, largo, alcanzando, el medio del lado, con espinas detrás; brocha ventral posterior, sobre cualquier lado **de** una quitinización triangular (como en Howardina); mechón dorsal con seis pelos, y una brocha de 4 pelos sobre cada lado; mechón lateral grande, en tres o cinco. Agallas anales más cortas que el segmento, puntiagudas.

Distribución geográfica: Antillas, Islas Vírgenes, Venezuela y Honduras.