

## Hojeando Revistas

*Sífilis y tuberculosis.* — Alfredo Nario, basándose en su estadística personal de 120 casos en los cuales han coexistido ambas enfermedades llega a las conclusiones siguientes:

- 1°— Que la sífilis no predispone hacia la tuberculosis.
- 2°—Que la sífilis influencia desfavorable la tuberculosis, agravándola cuando las dos enfermedades aparecen al mismo tiempo o contemporáneas.
- 3°—Que la sífilis más o menos remota en su inicio no predispone hacia la evolución fibrosa de la tuberculosis.
- 4°—Que en los casos de sífilis terciaria, si la sífilis y la tuberculosis coexisten, ellas evolucionan independientemente.
- 5°—Que el tratamiento antilúético en los tuberculosos **sifilizados** no ejerce ni localmente, ni generalmente, modificación alguna sobre la tuberculosis.
- 6°—Que las reacciones serológicas no revelan ninguna influencia de la infección lúética sobre el terreno tuberculoso.
- 7°—Que no existe el hibridismo sostenido especialmente por los viejos clínicos.

### *Tratamiento de la crisis de asma*

Medicamentos recomendados:  
1°—Clorhidrato de adrenalina en solución al 1 %. Es eficaz

únicamente por vía hipodérmica a la dosis corriente de 1 ce.

- 2°—La efedrina y la efetonina, las cuales son eficaces por vía oral. La efedrina se puede dar en inyecciones hipodérmicas a la dosis de 3 a 5 centigramos.
- 3°—La morfina.
- 4°—El cloruro de calcio por vía endovenosa a la dosis o. 0.50 egrs.
- 5°—preparados a base de belladona, datura, estramonio hiosciamus, etc., sean tinturas, extractos, polvo de hojas, etc., y los nitratos, particularmente el de potasio, mención especial merece la piridina asociada a aquellos medicamentos.
- 6°— Fórmulas empleadas corrientemente a base de los medicamentos citados anteriormente.

a)

Rp.  
Extracto de datura .. 0.05 gr.  
Jarabe de codeína .. 30 gr.  
Agua de laurel cerezo. 10 gr.  
Agua destilada, c. s. p. 150 ce.  
Tomar 1 cucharada cada hora.

b) Rp.

Tintura tebaica .....	4 gr.
Tintura de Belladona . .	4 „
Tintura de lobelia . . . .	10 „
Tintura de polígala . . . .	10 „
Tintura de datura . . . .	10 „
Yoduro de potasio . . . .	8 „
Agua de laurel cerezo ..	30 „
Agua destilada .....	50 „

Por cucharadas de café, hasta 5 por día.

c) Rp.

Nitrato de potasio . . . . 5 gr.  
 Polvo de hojas de datura . 8 „  
 „ hiociamus 8 „ „ „ „ „  
 belladona. 8 „ „ „ „ lobelia ...  
 8 „ Para quemar una  
 cucharadita en un braserito o  
 sahumador, aspirando los  
 vapores.

En el comercio se venden polvos semejantes, llamados de Andreu, Espie, Himrod, Esconplai-ze, etc.

d) He aquí una fórmula para cigarrillos antiasmáticos.

Rp.

Extracto de datura . . . . 5 gr.  
 Alcohol a 309 ..... 50 „  
 Tabaco en hojas . . . . 100 „  
 Yoduro de potasio . . . . 30 „  
 Nitrato de potasa . . . . 30 „

Para 100 cigarrillos, que se fuman inhalando el humo. 79—La piridina, de empleo muy sencillo, puede ser muy eficaz.

Se inhala vertiendo 10 a 15 gotas en el pañuelo o poniendo 4 a 5 gramos para que se evapore en una copa, en la habitación del asmático.

8?—El benzoato de bencilo al 20 %. Se toman 20 a 30 gotas 2

a 3 veces por día. 9?—Se recomienda como eficaz las pulverizaciones nasales

siguientes: Sufato neutro

de atropina ..... 0.01 gr.

Clorhidrato de cocaína 0.03 „

Solución adrenalina

al 1 % ..... 10 „

10°—El verdadero tratamiento de fondo es el que descubre en el asmático su espina

irritativa, equilibra su sistema vago-simpático y estabiliza sus coloides, desensibilizándolo.

*Medicamentos eficaces contra los dolores gástricos* Vanier, recomienda en primer lugar el subnitrito de bismuto a la dosis de 3 a 5 gramos 2 veces al día, mezclado con agua y<sub>2</sub> hora antes de las 2 comidas principales.

El carbonato de bismuto tiene indicaciones análogas y se puede usar asociado a la magnesia calcinada, al caolín y a la creta preparada.

La mezcla gelosa-gelatina da excelentes resultados. Gelatina pulverizada .. 0.20. gr.

Gelosa.....0.20 ,,

Para un papel.

A tomar en una infusión caliente en ayunos a la mañana y a la noche.

Mathieu, recomienda el bicarbonato de Soda en las fórmulas siguientes:

a) Bicarbonato de soda 20 gr.

Magnesia calcinada . . . . 5 ,,

Para 1 paquete. Tomar de media a una cucharada de café, en leche o agua al comienzo de los dolores, repitiendo la dosis cada 10 minutos si no se calman. b)

Bicarbonato de soda 0.50 gr.

Creta preparada . . . . 0.50 ,,

Magnesia calcinada .. 25 ,,

Subnitrito de bismuto 0.25 ,,

Para 1 papel. Disolver en agua y tomar al comienzo de los dolores, c) Se puede también recetar:

Citrato de soda..... 15 gr

Creta preparada .....10 ..

Magnesia calcinada .. 5 ,,

A tomar por cucharaditas de

café.

*Nuevo tratamiento de las quemaduras*

Hamant, presenta a la Sociedad de Medicina de Nancy una Quemadura de 3er. grado al nivel de los pies, la cual fue tratada por simple aplicación de una solución de ácido tánico al y<sub>2</sub> por ciento, la cual parece suprimir el dolor y la exudación. La curación fue renovada cada hora, durante 24 horas y después suprimida definitivamente. Este procedimiento simple y económico da resultados excelentes.

*Nuevo tratamiento del tracoma*

Guerrero, después de discutir la necesidad de un nuevo tratamiento sencillo y poco costoso del tracoma, describe un método que consiste, después de anestesiar por media hora el ojo con cocaína o novocaína al 10 por ciento, en tocar la superficie granulada con una torunda de algodón empapada en solución fenicada pura. Hay que tener cuidado de no tocar la conjuntiva barbar. Por lo común, no hay efectos contraproducentes, salvo por alguna pegajosidad, que puede remediarse lavando el globo ocular con solución boricada. En algunos casos en que la forma de aguda ha pasado a crónica, tal vez no vaste con una aplicación, más en los casos simples, si y rara vez hay recurrencias. El método surte más efecto en la forma granular o folicular, pero también puede utilizarse, aunque con menos éxito, en las papilares y mixtas.

*Antonio Vidal.*

Tegucigalpa, 10 de junio de 1934.