

MICETOMAS

Llámanse micetomas a las micosis de aspecto tumoral que toman preferentemente la piel y el tejido celular subcutáneo.

Segundo Chalmers y Archivald ha definido el micetoma come* sigue:

«El término micetoma comprende toda tumoración, deformidad o destrucción de los tejidos del hombre o de los animales, causada por la invasión de hongos pertenecientes a diversos géneros o > especies capaces de producir formaciones llamadas granos».

Características clínicas y micológicas permiten dividir los micetomas en dos grupos principales: micetomas actinomicóticos y maduromicóticos.

Es muy frecuente en las regiones tropicales y subtropicales, especialmente en los individuos que llevan los pies desnudos. La infección es de origen exógeno y la puerta de entrada suele ser una herida o erosión producida por una astilla. Se han informado casos localizados en los pies, en piernas, manos, tronco y cara.

La clasificación de los hongos productores por el carácter de pigmentación de los granos ha sido descartada a causa de la variedad de cultivos obtenidos, a pesar de haber sembrado granos de un mismo color.

Queremos llamar la atención sobre la enorme incidencia de micetomas que hay en nuestro país, procedentes de todos los rumbos. La inhabilitación para el trabajo y la invalidez es enorme.


De dieciséis casos de micetomas: 12 son varones y 4 son mujeres.

La edad ha oscilado entre dieciocho y cincuenta, años. Todos campesinos labradores.


La mayoría de las veces han llegado avanzados con reacción general sistémica por infección secundaria. Rarefacción ósea han presentado cinco y tres han tenido dolor en los nódulos con impedimento de la marcha.

Hemos tenido éxito terapéutico en los casos incipientes y en uno medianamente avanzado, con sulfadiazina y penicilina durante un mes consecutivo, y luego inyección endovenosa diaria de Lugol Fuerte e Hiposulfito de sodio al 20% 5 c.c. de cada uno, durante dos o tres meses. El período de observación mayor después del tratamiento es de dos años. De los cuatro casos excitosos ha habido recaída a los diez meses en uno solo, que mejoró al reiniciar el tratamiento. Se ha practicado la amputación en seis pacientes y el resto ha abandonado el Servicio.


Si tomamos en cuenta el número de pacientes con micetomas que no se hospitalizan por diversas causas (vías de comunicación, pobreza, temor, etc.) y los que ostentando un micetoma incipiente que se diagnostica equivocadamente como otra afección, evolucionando luego hacia el estado irreductible, tendremos un problema Médico Social enorme.




Extensión en fresco de fistula de micetoma actinomicótico en perforación con potasa



Intensa acantosis en corte histológico de micetoma



Grandes cavidades en huesos de pie y pierna en micetoma actinomicótico



Extensión fresca de un grano de micetoma

