

# SECCIÓN DE "LAS PREGUNTAS"

\* *Dr. TITO H. CÁRCAMO*

Nº1

(1) Cuál de las siguientes enfermedades da una inmunidad pasiva congénita transmitida in útero?

- (a) Rubéola
- (b) Paperas
- (c) T. B. C.
- (d) Viruela
- (e) Difteria.

(2) Cuál de las siguientes infecciones virales en una mujer embarazada no afecta al feto?

- (a) Rubéola
- (b) Influenza
- (c) Paperas
- (d) Viruela
- (e) Sarampión.

Nº2

(3) Qué es lo que más caracteriza al "estridor" laríngeo congénito?

- (a) Cianosis
- (b) Retracción Inspiratoria
- (c) Ronquera
- (d) Dificultad en atención de enfermería
- (e) Las infecciones respiratorias.

(4) Cuál de los siguientes es un signo importante en la obstrucción bronquial por cuerpo extraño?

- (a) Aumento en el "tremitus vocal"
- (b) Limitación de la expansión respiratoria
- (c) Hiperresonancia a la percusión
- (d) Disminución de los sonidos respiratorios.

---

(#) Jefe del Servicio de Ortopedia de Mujeres del Hospital «San Felipe». <\*\*\*>  
Catedrático de Embriología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

## Nº 3

(5) Con cuál de las siguientes enfermedades es muy frecuente confundir el cretinismo?

- (a) Mongolismo
- (b) Hipertelorismo
- (c) Macroglosia
- (d) Enanismo pituitario
- (e) Condrodistrafia.

(6) Cuál de los siguientes tumores cerebrales infratentoriales es visto con mayor frecuencia en la infancia?

- fa) Astrocitoma
- (b) Meduloblastoma
- (c) Retinoblastoma
- fd) Gloma
- (e) Ependimoma.

## Nº4

(7) Cuándo cree Ud. que la circuncisión está mayormente indicada?

- fa) **Fimosis**
- (b) Epispadios
- (c) Prepucio redundante
- (d) Balanopostitis
- (e) Parafimosis.

(8) Cuál cree Ud. que es la causa más frecuente de ictericia en un infante durante las primeras 24 horas de vida?

- (a) Eritroblastosis
- (b) Hepatitis infecciosa
- (c) Toxoplasmosis
- fe) Atresia biliar.

## Nº5

(9) Ante una manifiesta linfocitosis en la sangre cuál de las siguientes enfermedades cree Ud. que es la más probable?

- (a) Leucemia
- (b) Tosferina
- f c) Monoclosinfecciosa
- (d) Linfocitosis infecciosa
- (e) Anemia perniciosa.

## Nº 6 (10) Qué es lo que más

caracteriza a la Disautonomía Familiar?

- (a) Lacrimación excesiva
- (b) Respiración excesiva
- (c) Inestabilidad emocional
- (d) Infecciones pulmonares frecuentes
- (e) Tartamudeo.

## Nº7

(11) Cuál cree Ud. que es la principal causa de mortalidad materna?

- (a) Infección
- (b) Hemorragia
- (c) Toxemia
- (d) Incompatibilidad Rh
- (e) Ninguna de las anteriores.

(12) En cuál período es más frecuente la mortalidad neonatas?

- (a) En las primeras 24 horas
- (b) Entre 24 y 72 horas
- (c) .En la primera semana
- (d) En la segunda semana
- (e) Dentro del primer mes.

## Nº 8

(13) Hasta qué edad cree Ud. que la sangre fetal se mantiene aislada y sin ningún contacto con la sangre materna?

- (a) 8 días
- (b) 12 días
- (c) 17 días
- (d) 21 días
- (e) 25 días.

(14) Cuál de los siguientes músculos integran el perineo?

- (a) Perineo transverso profundo
- (d) Constrictor de la uretra
- (c) Ilecoxígeo
- (d) Puburectalis
- (e) Todos los anteriores.

## Nº 9

(15) Cuál es el sistema más constante en la infección puerperal?

- (a) Elevación de la temperatura
- (b) Fetidez de los loquios
- (c) Dolor abdominal
- (d) Leucocitosis
- (e) Relajación uterina.

(16) En cuál de los siguientes órganos se encuentran lesiones patognomónicas de la eclampsia?

- (a) Riñon
- (b) Hígado
- (c) Corazón
- (d) Cerebro
- (e) Ninguno de los anteriores.

**Nº 10**

(17) Una de las siguientes causas no produce ictericia en el recién nacido. Cuál es?

- (a) Sífilis
- (b) Incompatibilidad Rh
- (c) Enfermedad Citomegálica
- (d) Atrosia biliar
- (e) Carcinoma del páncreas.

(18) Cuál es la prueba más importante para detectar una "mola hidatiforme"?

- (a) Rh abdominal
- (b) Examen pélvico
- (c) Prueba de Papanicolaou
- (d) Niveles de la gonadotropina coriónica en el suero
- (e) Ninguno de los anteriores.

(19) En cuál de las siguientes maniobras se lleva a cabo la aplicación de doble fórceps?

- (a) En la maniobra de Ecanzonil
- (b) En la maniobra de Leopold
- (c) En la maniobra de Brandt
- (d) En la maniobra de Ritgen
- (e) En ninguna de las anteriores.

**Nº 12**

(20) Cuál cree Ud. que es en la actualidad la causa más común de la mortalidad materna?

- (a) Infección
- (b) Desproporción cefalopélvica
- (c) Ruptura uterina
- (d) Toxemia
- (e) Ninguna de las anteriores.

La Clave a la contestación de las preguntas es la siguiente:

(Nº 1: c)	(Nº 2: c)	(Nº 3: a)	(Nº 4: a)	(Nº 5: d)	(Nº 6: c)
(Nº 7: b)	(Nº 8: e)	(Nº 9: e)	(Nº 10: a)	(Nº 11: b)	(Nº 12: a)
(Nº 13: c)	(Nº 14: e)	(Nº 15: a)	(Nº 16: e)	(Nº 17: e)	(Nº 18: d)
(Nº 19: a)	(Nº 20: e)				