

# CUESTIONARIO DE LA REVISTA MEDICA HONDURENA: 2

*Dr. Ramiro Coello-Cortés\**

Este cuestionario se preparó con material obtenido de artículos publicados en esta Revista. ¡Las preguntas aparecen numeradas en prosecución. A cada pregunta corresponde una sola respuesta correcta. Suerte.

6. ¿Cuál de las siguientes es la NEOPLASIA más común en biopsias de OVARIO?
- A) Cistadenofibroma
  - B) Teratoma
  - C) Cistadenocarcinoma
  - D) Dísgerminoma
  - E) Tumores metastásicos
7. Durante el postoperatorio, las principales reacciones adversas debidas a la KETAMINA son de tipo:
- A) cardiovascular
  - B) respiratorio
  - C) psíquico
  - D) digestivo
  - E) urinario
8. En la ESCLEROSIS TUBEROSA suele observarse todos los siguientes EXCEPTO:
- A) adenomas sebáceos
  - B) convulsiones
  - C) retardo mental
  - D) neurofibromas
  - E) herencia autosómica dominante
9. En niños escolares de áreas rurales el PARÁSITO INTestinal más frecuentemente detectado por examen coproparasitológico es:
- A) Entamoeba histolytica
  - B) Giardia lamblia
  - C) Ascaris lumbricoides
  - D) Trichuris trichiura
  - E) Hymenolepis nana
10. Los TRAUMATISMOS DE PÁNCREAS:
- A) Se observan casi exclusivamente en hombres
  - B) Ocurren con preferencia en abdomen traumático abierto.
  - C) Se acompañan de peritonitis generalizada
  - D) Todas las anteriores
  - E) Ninguna de las anteriores
7. C: Psíquico. El clorhidrato de ketamina es un anestésico eficaz y seguro que produce analgesia rápida sin alteración de la circulación y con escasos efectos respiratorios. Estas propiedades lo hacen útil en casos quirúrgicos que se acompañan de hemorragia intensa o estado de choque. Entre sus desventajas está la frecuente aparición, durante el postoperatorio, de alteraciones psíquicas que incluyen ataques de angustia, labilidad emocional, nerviosismo, conducta aberrante y estados delirantes. Los ensue-

---

\* Coordinador del Comité de Investigación, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.A.H.

## RESPUESTAS:

6. B: Teratoma. En un estudio realizado en los hospitales públicos de Tegucigalpa (3)

ños vividos {alucinaciones hipnagógicas) se observan en un 60/0 de los casos y son muy desagradables debido a sensaciones angustiosas de desintegración corporal (4).

D: Neurofibromas. La esclerosis tuberosa es una displasia compleja que se hereda por un gene autosómico dominante. La tríada clásica de la enfermedad está constituida por adenomas sebáceos, epilepsia y retardo mental. Como no todas las manifestaciones están presentes al momento del nacimiento el clínico debe estar prevenido para encontrar las formas parciales del trastorno (2). Los neurofibromas son más típicos de la enfermedad de von Recklinghausen.

C: *Ascaris lumbricoides*. En niños escolares de las áreas rurales la infestación por *Ascaris lumbricoides* es la más frecuente. En tres estudios de áreas rurales Zepeda y Barahona encontraron una prevalencia por especie de parásito de 70o/o (5), 92o/o (6) y 800/0 (7) para el *Ascaris lumbricoides*, siendo este el parásito más común a cualquier edad en comparación con los otros. Se demostró que más de la mitad de los niños escolares

de las áreas rurales están infectados por este helmineto.

10. D: Todas las anteriores. Durante un período de diez años Zúñiga (8) estudió 910 traumatismos abdominales encontrando siete casos (0.7o/o) de traumatismo pancreático. Todos ellos ocurrieron en el sexo masculino, se acompañaron de peritonitis aguda generalizada y de lesiones traumáticas de otros órganos. Seis de los casos se presentaron con abdomen traumático abierto causado por arma de fuego y blanca En el traumatismo pancreático la radiología y el laboratorio son de poca utilidad diagnóstica El tratamiento es quirúrgico La mortalidad es casi de un 60o/o.

#### REFERENCIAS:

1. CARDONA LÓPEZ, V: Linfosarcoma primario del ovario. Rev. Med. Hondur. 1969, 37:66-71.
2. CORRALES PADILLA, H: Deficiencia Mental y Piel. Rev. Méd. Hondur. 1972, 40:123-165.
3. FERRERA de ERAZO C, TABORA, Y.R. de: Neoplasias de Ovario. Revisión de la experiencia en los Hospitales General y Materno Infantil de Tegucigalpa, 1977. Rev. Med. Hondur. 1978: 47:33-39.

4. RIVERA R, OA: Anestesia Disociativa con Clorhidrato de Ketamina (Ketalar). Estudio clínico de 300 casos. Rev. Med. Hondur. 1970, 38: 181-190.
5. ZEPEDA JE, BARAHONA GA: Estudio Coproparasitoscópico Escolar en Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, Honduras. Rev. Med. Hondur. 1970, 38: 74-77.
6. ZEPEDA JE, BARAHONA GA: Estudio Coproparasitoscópico Escolar en el Chimbo, Departamento de Francisco Morazán, Honduras. Rev. Med. Hondur. 1970, 38: 195-198.
7. ZEPEDA JE, BARAHONA GA; Estudio Coproparasitoscópico Escolar en Monjarás, Departamento de Choluteca, Honduras. Rev. Med. Hondur. 1971, 39: 306-309.
8. ZUÑIGA, SR: Abdomen Traumático. Traumatismo del Bazo y el Páncreas. Rev. Med. Hondur. 1969, 37:12-34.