

IMAGEN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Síndrome de Turner

Juan Lorenzana Cruz*, Ana Rosa Novoa**



Recién nacido hijo de paciente de 43 años gestas 7, partos 3 abortos 3, con 3 hijos vivos, la cual tuvo cinco controles prenatales, sin antecedentes de importancia y llegó a la Sala de Emergencia del Hospital Materno Infantil en trabajo de parto avanzado, con una sospecha de polihidramnios. El parto ocurrió sin complicaciones, obteniéndose un producto vivo, de sexo fenotípicamente femenino, peso de 1580 grs, Apgar de 7 y 8 al primer y quinto minuto respectivamente, talla de 39 cms, calculando aproximadamente 4000cc de líquido amniótico. El recién nacido se catalogó como Síndrome de Turner por los siguientes hallazgos fenotípicos: Talla baja, línea de implantación del pelo baja, membrana cervical, cúbito valgo, tórax en escudo. Además se detectaron otros hallazgos sistémicos de atresia de esófago y cardiopatía congénita. El recién nacido tuvo una tórpida evolución hasta el fallecimiento a los cinco días de nacido.

* Gineco-obstetra, IHSS. Dirigir correspondencia a lorenzanaacruz@multivisionhn.net

** Pediatra, Centro Médico Bethel, Tegucigalpa.

Se invita a los colegas a enviar su colaboración a esta sección de la Revista Médica Hondureña