


LIQUEN ESTRIADO

Striatus lichen

Gustavo A. Lizardo Castro,¹ Diana Maricela García²

¹Servicio de Dermatología del Hospital Escuela, Tegucigalpa, Honduras.

²Postgrado de Dermatología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras/Hospital Escuela, Tegucigalpa.



Masculino de 15 años con lesión lineal en miembro superior derecho de 8 meses de evolución, constituida por pápulas y placas con discreto eritema y descamación fina, asintomática, que se extiende desde el hombro (**Figura 1A flechas**), cara lateral externa del brazo y antebrazo (**Figura 1B**), hasta el dedo pulgar produciendo distrofia ungueal (**Figura 1C**). Del liquen estriado se desconoce etiología, afecta ambos sexos, más frecuente en edad preescolar, localizado principalmente en extremidades, raramente afecta uñas. Remite en forma espontánea entre 3-12 meses, pero puede durar hasta 4 años. Los esteroides tópicos son de alguna utilidad. Es diagnóstico diferencial de varias dermatosis que pueden adoptar este patrón lineal como el nevo epidérmico, psoriasis, liquen plano, etc; todas con tratamiento y evolución diferente por lo que el diagnóstico definitivo requiere biopsia. La **Figura 2A** muestra microfotografía de piel con un proceso liquenoide, en la **Figura 2B**, un acercamiento del mismo en el cual se distingue estrato córneo hiperqueratósico, leve acantosis del estrato de Malpighi, células disqueratósicas y degeneración vacuolar del estrato basal, la dermis exhibe un infiltrado inflamatorio mononuclear en banda y melanófagos que confirma el diagnóstico de liquen estriado.

Recibido: 05/ 2011, aceptado con modificaciones menores: 06 de 2011

Dirigir correspondencia a: Dr. Gustavo A. Lizardo Castro, Correo-E: glizardoc@yahoo.com